


Kopfschmerz



- RED Flags:**
- Ottawa SAH Tool Cannot Rule Out
 - Fieber, Antibiotische Therapie vor Kurzem
 - Nackensteife, Bewusstseinsstörung
 - Akuter Beginn der Kopfschmerzen (Sek.-Min.)
 - Fokal neurol. Defizit jetzt oder anamn.
 - Krampfanfall, Synkope
 - Malignom, Immunsuppression
 - Schwangerschaft letzte Trim. o. postpartal 4 Wochen
 - Alter > 75 Jahre

- Kriterien POCUS N. opticus**
- 3mm hinter der Papille gemessen
 - Grenzwert Breite >5mm
- Bei über 5mm Hirndruckverdacht
→ CT vor LP

- CT vor LP nicht zwingend notwendig wenn:**
- Alter unter 60 Jahre
 - Keine Immunsuppression
 - Keine maligne Erkrankung
 - Kein Krampfanfall letzte 7 Tage
 - Fokussierte neurologische Untersuchung unauffällig
- Bei diesen Patienten kann erhöhter Hirndruck auch mit Augen POCUS erkannt werden. (N. Opticus Messung)

- Ottawa SAH Tool**
- Einschlusskriterien**
- Wache Patienten >15 Jahre
 - Neuer, starker, atraumatischer Kopfschmerz
 - Maximale Intensität erreicht < 1 Stunde
- Ausschlusskriterien**
- Neues neurologisches Defizit
 - Anamnest. Aneurysma
 - Anamnest. SAH
 - Anamnest. Hintumor
 - Anamnest. rez. Kopfschmerzen (3 oder mehr in den letzten 6 Monaten)
- Toolkriterien**
- Alter > 40 Jahre
 - Nackenschmerzen oder Nackensteife
 - Beobachteter Bewusstseinsverlust
 - Beginn bei Belastung
 - Donnerschlag Kopfschmerz (sofort maximal)
 - Beeinträchtigte Nackenbeugung
- Wenn alle Toolkriterien negativ SAH ausgeschlossen

Neue DD
®
Facharzt ZINA

Neue DD
®
Facharzt ZINA